
.....Santé des 25-64 ans en Bretagne

La mortalité en rapport avec la consommation d'alcool dans la population de 25-ans

A retenir

La mortalité due à la consommation d'alcool est plus élevée en Bretagne, chez les hommes, par rapport à la moyenne française.

Chez les hommes, les cancers des voies aéro-digestives supérieures sont la première des causes : 52 décès pour 100000 hommes de 25 à 64 ans, en Bretagne (1995-97) ; en deuxième cause, la cirrhose du foie : 38 décès pour 100000 hommes en Bretagne.

Chez les femmes de 25 à 64 ans, la première cause de mortalité due à la consommation d'alcool est la cirrhose du foie : 13 décès pour 100000 femmes de 25-64 ans en Bretagne (11 en moyenne française).

En Bretagne et en France

La consommation excessive d'alcool est la cause directe de la cirrhose du foie et de la psychose alcoolique. De plus, la consommation d'alcool, avec la consommation de tabac, est facteur de risque des cancers des voies aéro-digestives supérieures (lèvres, cavité buccale, pharynx, larynx et œsophage)

Chez les hommes de 25 à 64 ans en Bretagne, ces trois causes sont responsables de 780 décès (dont 272 par cirrhose du foie et 375 par cancer des Voies Aéro-Digestives Supérieures).

Chez les femmes de 25 à 64 ans en Bretagne, ces trois causes totalisent 147 décès dont 95 décès par cirrhose du foie.

De la période 1988-90 à la période 1995-97, le nombre de décès a diminué chez les hommes et chez les femmes.

Nombre annuel moyen de décès liés à la consommation d'alcool en Bretagne

	Hommes		Femmes	
	1988-90	1995-97	1988-90	1995-97
Cirrhose du foie	308	272	118	95
Psychose alcoolique et alcoolisme	159	133	37	30
Cancer des VADS	504	375	20	22

Sources : INSERM SC8 Exploitation ORS Bretagne

Chez les hommes, les taux de mortalité ont baissé en Bretagne comme en moyenne française de la période 1988-90 à la période 1995-97 et l'écart Bretagne/France reste stable. La surmortalité bretonne est importante : 37.8 décès par cirrhose du foie pour 100000 hommes en Bretagne, contre 25.7 en France sur la période 1995-97, et 51.5 décès par cancers des voies aéro-digestives supérieures pour 100000 hommes en Bretagne contre 35.6 en moyenne française sur cette même période.

Taux comparatifs de mortalité chez les hommes par causes de décès attribuables à la consommation d'alcool. Taux pour 100000 hommes de 25 à 64 ans

	Bretagne		France	
	1988-90	1995-97	1988-90	1995-97
Cirrhose du foie	45.2	37.8	31.4	25.7
Psychose alcoolique et alcoolisme	23.8	18.7	11.8	9.1
Cancer des VADS	71.7	51.5	49.4	35.6

Sources : INSERM SC8, INSEE Population de référence France RGP 1999

Chez les femmes, les taux de mortalité ont baissé concernant deux causes : cirrhose du foie et psychose alcoolique et alcoolisme

L'écart Bretagne/France est conservé de la période 1988-90 à la période 1995-97 concernant les deux causes résultant directement de l'alcoolisme :

- 12.7 décès par cirrhose du foie chez les femmes en Bretagne contre 11.1 en moyenne française,
- 4.2 décès par psychose alcoolique et alcoolisme chez les femmes en Bretagne contre 2.1 en moyenne française.

Les taux de décès par cancers des voies aéro-digestives supérieures sont stables chez les femmes, entre la période 1988-90 et la période 1995-97. Pour cette cause, les femmes en

Bretagne ont des taux inférieurs à ceux de la moyenne française : 2.8 décès pour 100000 femmes de 25-64 ans en Bretagne contre 3.4 en moyenne française au cours de la période la plus récente.

Taux comparatifs de mortalité chez les femmes par causes de décès attribuables à la consommation d'alcool. Taux pour 100000 femmes de 25 à 64 ans

	Bretagne		France	
	1988-90	1995-97	1988-90	1995-97
Cirrhose du foie	17.0	12.7	13.9	11.1
Psychose alcoolique et alcoolisme	5.3	4.2	2.7	2.1
Cancer des VADS	2.8	2.8	3.6	3.4


Sources : INSERM SC8 INSEE Population de référence France RGP 1999

Dans les départements

A l'échelon départemental, les taux comparatifs montrent des différences très importantes chez les hommes :

76 décès pour 100000 hommes de 25-64 ans en Ile-et-Vilaine,
126 décès pour 100000 hommes de 25-64 ans dans le Finistère.

Les quatre départements présentent une surmortalité par rapport à la moyenne française.




Sources : INSERM, INSEE
Population de référence France RGP 1999
Exploitation ORS Bretagne

Remarque : à l'échelon départemental, les 3 causes sont regroupées pour le calcul des taux comparatifs, en raison notamment de faibles effectifs de décès, à cet échelon départemental, chez les femmes.

Chez les femmes de 25-64 ans en Bretagne, les taux de mortalité résultant de la consommation d'alcool sont plus élevés dans les départements du Morbihan (24,4 décès pour 100000 femmes de 25-64 ans) et des Côtes d'Armor (20,4) que dans le Finistère (18,7) et l'Ile-et-Vilaine (16,7).

Le département d'Ile-et-Vilaine a un taux de mortalité égal à celui de la moyenne française. Côtes d'Armor, Finistère et Morbihan ont des taux de mortalité plus élevés qu'en moyenne française.



Sources : INSERM, INSEE
Population de référence France RGP 1999
Exploitation ORS Bretagne

